

بسم الله الرحمن الرحيم

LAXATIVES

- Lactulose (syrup) 5 LÆ صغيرة 3 ملعقة مرّات يوميّا
Picolax (drops) 2LÆ الحامل و الأطفال
Enemax
Glycerin (supp) Ad , PED 1LÆ للرضع
Laxel (eff) 3LÆ
Nassar (tab) 1.5LÆ
Prostigmine (tab) 3LÆ لضعف حركة الأمعاء

الإسهال

- Antinal (cap , susp) 5LÆ قرص 3 مرّات يوميّا
Flagyl (susp , tab) 6LÆ قرص 3 مرّات يوميّا لمدة 7 أيام
Entocid - H (tab) للإسهال مع المغص
Furazol (susp , tab) 7 أيام 3 ملعقة 3 مرّات أو قرصين كلّ 8 ساعات 7 أيام

الإسهال عند الرضع

- kapect susp 3 ملعقة 3 مرّات يوميّا
smecta 10 كيس عليّ سم ماء
spasmotal drops 3 مرّات يوميّا
Rehydrane packet
كيس عليّ 200 مل ماء يعطي 15 مل بعد كلّ مرّة إسهال

الإسهال البكتيري في الأطفال (إسهال الصيف):

- Septazole susp 12 ساعة بعد الأكل 3 ملعقة كلّ
Antinal susp 3 مرّات بعد الأكل 3 ملعقة كلّ
Pyral syrup 3 مرّات يوميّا
Visceralgine syrup 3 مرّات قبل الأكل

عسر الهضم

- Spasmo amrase (tab)
Spasmodigestin (tab)
Zymogen forte (tab)

Irritable bowel syndrome:

- Brane tab 3 قرصين 3 مرّات يوميّا قبل الأكل بنصف ساعة
Librax 3 قرص 3 مرّات يوميّا (علبة واحدة)
Colona 3 قرص 3 مرّات قبل الأكل بنصف ساعة
Spasmoamrase 3 قرص 3 مرّات بعد الأكل

الانتفاخ

- Primperoxane (tab) 3LÆ
Disflaty (tab)
Mentothicone (cap)
Meteospasmyl (cap) 13LÆ

المغص والانتفاخ عند الأطفال:

- Visceralgin syrup عند اللزوم
Simethicone susp 3 مرّات 3 ملعقة
Postine digestive syrup 3 مرّات 3 ملعقة كبيرة
المغص و الانتفاخ عند الرضع :
Gripe water syrup 3 مرّات 1/2 مملعة
Spasmotal drops 3 مرّات 3 ملعقة
Simethicone drops 3 مرّات بعد الرضاعة 3 ملعقة

إضطرابات

المعدة

Colona (tab) 10LE

Tritone (tab) 1x3

المغص

Visceralgin (syrup) 1x3

Buscopan Plus (tab)

Spasmofen (amp)

: للأطفال و الرضع

Baby quiet (syrup)

Baby rest (drops)

Spasmotal (drops)

Renal, biliary drugs

Renal colic :

Spasasmfen amp

Uricol كيس علي نصف كوب ماء

Rowatinex cap كبسولتين 3 مرات قبل الأكل

Oxalate \Rightarrow in urine analysis :

Epimag (sachets) كيس علي نصف كوب ماء 3 مرات يومياً

Lower UTI :

Uvamin (mild) (cap) 10LE كبسولة كل 6 ساعات لمدة 5 أيام

UTI : Noracin 400 (severe*) (10 tab) 18 LE قرص كل 12 ساعة بعد الأكل لمدة 7 أيام

*severe if pus cells > 30 /HPF

القئ والغثيان

Cortigen B6 (amp) ad, ped 4 LE

Vomistop (cap) قرص قبل النوم أو عند اللزوم

Primperan (Tab, amp) قرص قبل الأكل بنصف ساعة 3 مرات يومياً

(hiccup)

: للحمل

Ezadoxine قرص قبل النوم

Dizirest B 6 (1ST 3 Months)

*Dramenex (sultan) (cap) قرص 3 مرات يومياً لدوار البحر و التراجع والغثيان عند المسافرين

الحموضة

Epicogel (mucogel) (susp) ملعقة كبيرة 3 مرات يومياً مضاد للإنتفاخ

Zantac (tab) (300 1x1 , 150 1x2) (20LE) للحموضة مرة واحدة

Ranitidine (أرخص)

Famotin 20mg (tab) for recurrence مرة واحدة ليلاً

Peptic ulcer :

Peptic ulcer for 2 w :

Omepral cap 4w كبسولة مرة واحدة يومياً قبل العشاء

Claribiotic 500 cap كبسولة كل 12 ساعة

Omepral (cap) كبسولة قبل الأكل مرة واحدة يومياً لمدة شهر

Conaz (10tab) 16LE قرص 3 مرات يومياً

Gastrofai 500, 1000 (tab) قبل الفطار والعشاء

الديدان

* البلهارسيا :

Distocide 600 mg (tab) during meals 20-40mg/kg 1 or 2 doses

*Tinea saginata & soleum H nana :

Yomesan (mirazid cap)

أقراص للمضغ تمضغ جيداً ثم تبتلع بالماء في اليوم الأول أربع أقراص مرة واحدة ثم قرصين يومياً لمدة أسبوع ويؤخذ laxel فوار بعد ذلك
كيس علي نصف كوب ماء 3 مرات يومياً

Bendax (tab 200mg, susp 100mg/5ml

قرصين مرة واحدة و strongylodiasis, taeniasis قرصين مرة واحدة يومياً لمدة 3 أيام أو 20 مل من زجاجة 30 مل مرة واحدة
يوميّاً ممكن يكرر بعد أسبوعين ثم أربعة

Fluvermal (susp) ملعقة كل 12 ساعة لمدة 3 أيام ممكن يكرر بعد أسبوعين ثم أربعة

Antiver قرص مرتين يومياً لمدة 3 أيام لا يؤخذ في الحمل

Hyperuricaemia & gout

Chronic :

Zyloric (allopurinol) 100, 300 mg (tab) 800-200 مجم علي جرعتين

Acute:

Urosolvine (cholchicine) (eff) 1x3 not with NSAIDs & renal and hepatic pts

Common cold

Night & Day (tab) 1 x 2

Cafamol (tab) 1 x 2

Congestal syrup

البرد عند الأطفال :

Rhinostop drops 1x3
Curisafe 250 susp 1 / 12h
megafen syrup 1x3

البرد عند الرضع :

Otrivin baby saline drops 2x3
Curisafe 100 drops 1 / 12h
Cetal drops, syrup 1x3

Cough

Dry :

Codilar, sinecod (syrup)

Tuscapine (syrup)

Wet :

للأطفال والرضع :

sinecod syrup/2 drops 3time الجافة
mucophylline + bisolvon + بلغم
syrup / 7 drops 3times

الكحة الجافة :

Codilar (sinecod) syrup

1 1/2 ملعقة كبيرة 3 مرات بعد الأكل

Ventoline 2mg tab

قرص 3 مرات بعد الأكل

Vendexine syrup

ملعقة كبيرة مرتين يومياً بعد الأكل لمدة 3 أيام

Bronchophan, Ventoline Expect , Guava Trix (syrup)

BroZedex (syrup)

Tuskan (syrup)

Bronchial Asthma

O2 40-60 %

Stage I :Nebulizer

2ml Normal Saline + 0.25 mg Atrovent (Ipratropium Bromide) + 2.5 mg Farcoline (salbutamol) **NB:** IF 2 amp greater improvement

Stage II :Infusion:

Glucose 5% + Solu-cortef (vial) (hydrocortisone 100mg) + amp minophylline + Bisolvon (amp)

STAGE III: inbetween attack:

- 1- Clenil (inhaler) 2 بخة صباحاً و 2 بخة مساءً
- 2 - Quibron (tab) 1/2 قرص كل 12 ساعة وتشرّب سوائل كثير
- Bricanyl (syrup) للحمل

Anti Histaminic

Fenistil (tab, syrup)

Avil amp, tab, syrup

Topical:

Allergex (cream) 1.5LE 1x2

Non sedative

For Insect bite – urticaria – eczema – angioedema – food & drug allergy - allergic rhinitis – allergic conjunctivitis

Allerfen (60, 180 tab)

Claritine (Tab 10, Syrup 5) قرص مرة واحدة يومياً

Corticosteroid

Epidron (vial) حقنة عضل مرة أو أكثر حسب الحاجة

Diprosos (amp) 15LE kenacort (vial) عضل مرة واحدة فقط

Apidone (syrup) (dexa & chlorpheniramine) للأطفال 1/4 ملعقة 3 مرات للأكبر 1/2 ملعقة 3 مرات وللکبار ملعقة 3 مرات

Sexual

Vivecta

Vigadol

مخدر موضعي:

Spearmint (spray)

: للآلام الجماع للمرأة

KY gel

الكحة المصحوبة ببلغم:

Mucophylline syrup

1 1/2 ملعقة كبيرة 3 مرات بعد الأكل

Vendexine syrup

ملعقة كبيرة بعد الأكل مرتين يومياً لمدة 3 أيام

الأزمة في الأطفال:

Minophylline ped .supp. لبوسة كل 12 ساعة

Zaditen syrup ملعقة كل 12 ساعة لمدة 6 شهور

Bisolvon drops نقط 3 مرات يومياً بعد الأكل

Apidone syrup ملعقة 3 مرات يومياً لمدة 5 أيام ولا يكرر

: لبناء العضلات

Decadurabolin (25-50) amp weekly

Vitamins

Biovit 12 (amp) (macrocytic anaemia) حقنة كل أسبوع في أول شهرين ثم كل شهر لمدة 3 شهور

Erthropiotin (vial) 37LE (anaemia in RF) حقنة 1-3 مرات أسبوعياً

Neurobion (amp) حقنة كل أسبوع لإلتهاب الأعصاب في كبار السن والسكر

Activate 200 (tab) قرصين بعد الفطار مقوللذاكرة

Vit D D3 natural 4500 (drops)

Ginseng GK 850 (Cap) **JOKAR 1200** (Cap) **Ginkor forte** (cap)

: فيتامينات للرضع

Bebe vit (drops) 1/2 dropper once daily

: للأطفال

Vitamount (syrup) ملعقة 3 مرات يومياً قبل الأكل

LMCO seas (syrup) للوقاية من الكساح (زيت كبدة الحوت) ملعقة 3 مرات يومياً

: للكبار

Supravit

Viterra plus (فايزر) 6 LE

Vitamax plus (جلاكسو) كبسولة مرة واحدة بعد الفطار (cap)

Vitona plus (36 compound)

Vivamax 3 (Cap) تنظيم الساعة البيولوجية قرص قبل النوم

: فاتح للشهية

Tres - Orix Forte (Syrup) ملعقة 3 مرات قبل الأكل بنصف ساعة

: بناء الأجسام

Weight gainer (powder) للأطفال ملعقة علي كوب لبن ولل كبار ملعقتين علي كوب لبن 3مرات يومياً

الأنيميا ونقص الكالسيوم

Osteoporosis

Evista 60 (tab) نقص الكالسيوم (النمو والتسنين والحمل والرضاعة والياس والغسيل الكلوي ولين العظام)

Calcium Sedico (eff) (Ca, D, C) كيس فوار مرة واحدة بعد الأكل

FerroCal (cap) (Ca, D, C, Iron, Zn, Folic acid) once daily

Iron deficiency anaemia

Haemoton (cap) GSK 10 LE 1-2 كبسولة مرة واحدة يومياً يناسب الحمل

Obron (40cap) pfizer 6LE لمنع الأنيميا أثناء الحمل كبسولة مرة واحدة يومياً

Fefol (cap) (ferrous sulfate) once daily

لو فشل oral بعد 4-6 شهور نستخدم parenteral مثل jectofar

المسكنات

: للأطفال

Megafen (syrup) (pa+ibu) 2.75 £E ملعقة 3 مرات يومياً

Brufen (syrup) 4.5£E 3X1

Novacid (syrup) 2 £E

Vegaskine (supp)

Dolphin-K drops & Supp 1x1

: للكبار

Parofen(30tab) 7.5£E (pa500+ibu400) قرص 3 مرات يومياً

DolphinK (amp) 6£E حقنة كل 12 ساعة

Cataflam 25 / 50 (10cap) 9£E كبسولة كل 12 ساعة

Indocid (cap & vial) كبسولة 3 مرات يومياً

ketolgin & Orudis amp حقنة كل 12 ساعة

mexicam & Anti cox II (7.5&15) (Cap & amp & supp) مرة واحدة بعد الأكل

: المسكنات بروشتة

Acupan (tab & amp) قرص 3 مرات / حقنة 4 مرات

Nalufin (amp) إلى 4 حقن ورید ببط أو تحت الجلد أو عضل

Tramadol (amp) (n't in renal & hepatic pts

inePethid 50 & 100 (amp)

ANTAGONIST:

Naloxone (amp) 1-5 أمبول كل 3 دقائق حتى التحسن أو 10 مجم

Muscle relaxant

Myolgin (20 cap) 10 £E كبسولة 3 مرات يومياً

Dimra (tab)

Myolastan (tab) 18 £E لتقلص العضلات الشديد

Antibiotic

: للأطفال

Ibidroxil , Curisafe 125 , 250 (drops100 , susp) 8 £E ملعقة كل 12 ساعة

Cefotax 250, 500 (vial) 6£E حقنة كل 12 ساعة

Flumox 250 , 500 (susp , vial) كل 6 ساعات

E-mox 125 , 250 4.5£E ملعقة كل 8 ساعات

Hibiotic 156,312 15£E (susp) ملعقة كل 8 ساعات

Septtrin (Susp) ملعقة كل 12 ساعة

Erythrocin (susp) في حساسية البنسيلين / ملعقة كل ساعات

: الحمل

Ceporex (125,250,500,1000) (Tab 15£E , vial 8£E susp 10£E) كل 6 ساعات

Cephotox (vial) كل 12 ساعة

Flumox

Emox (Cap , vial) كبسولة كل 8 ساعات

Ampicillin

الكبار :

Cefotax 1000 (vial) حقنة عضل أو وريد كل 12 ساعة

Ibidroxil 500 Cap 6LE, 1000Tab 9LE كبسولة كل 12 ساعة

Flumox 500, 1000 (16cap 12LE, vial 6LE) كبسولة أو حقنة كل 6 ساعات

Septtrin & sutrim & Septazole Forte (tab) قرص كل 12 ساعة

Curisafe cap 1x12

Angina

During attack:

Angised 0.5 (tab) قرص تحت اللسان ويكرر لعدد 3 أقراص كل 10 دقائق وإلا يُحول للمستشفى *MI*

Inbetween attack:

1 - **Nitrocare SR** 2.5, 6.5, 9 (cap) كبسولة 3 مرات يومياً

2- **Isoptin** (tab) قرص 3 مرات يومياً

Hypertension

< 55 y or not black	>55 y or black
ACE Capoten 25, 50 (tab) 10 LE قرص مرتين يومياً قبل الأكل بساعة Enalapril 5, 20 (tab) 17LE قرص مرة واحدة يومياً ± β Blocker : Ateno 50, 100 (tab) 3LE قرص مرة واحدة مساءً	CCB: Isoptin 80 (tab) 6-1 أقراص مرتين يومياً Epilat 10, 30 (cap) 5LE قرص 3 مرات يومياً تفرش ثم تبتلع في الطوارئ ± Diuretic : Aldactazide (tab) قرص مرة واحدة يومياً Moduretic (Tab) 1- ½ قرص يومياً أو يوم بعد يوم

In Emergency :

If systolic is high **Lasix** 40 (5amp) 3 LE يستحسن من غير محلول

If diastolic is high **Epilat** كبسولة تحت اللسان

الحمل :

Aldomet 250 (tab) قرص مرتين يومياً

hypotension

Hypotension: sever cases give amp dexamethasone

Effortil (tab 5, drops 7.5) 4LE 10 نقط 3 مرات يومياً

Gutron (tab, drops) 5LE قرص 3 مرات قبل الأكل

Orthostatic Hypotension:

Fall in S ≥ 20 , D ≥ 10 (ask for; blood sugar, urea, Hb) standing $\frac{-10}{+10}$

Astonin H (20 tab) 5LE قرص مرة واحدة قبل الأكل

: منشط للدورة الدموية

Stugeron 25 tab 11 LE قرص صباحاً وقرص مساءً

+ **Trental** tab قرص صباحاً وقرص مساءً

+ **Ginkor forte** (cap) 22 LE كبسولة 3 مرات بعد الأكل

Meniere:

Betaserc 8, 16 tab قرص 2-3 مرات يومياً

+ **Vascular** cap كبسولة كل 12 ساعة بعد الأكل

: لوقف النزيف

Konakion 5 amp 35LE حقنة عضل كل 12 ساعة

: لتصريف الكدمات

Alphintern 20 tab 12LE قرص مرتين يومياً

: منشط لأداء المخ

Nootropil (200 syrup, 400 cap, 800 tab, 1000 amp) 12LE 2-3 مرات يومياً

: مضاد للإكتئاب

Fluoxetine cap كبسولة مرة واحدة يومياً

: الجلطة

Clexane 20,40,60,80 40-80u /sc/12h prophylactic 20-40 u / sc /12h

Epilepsy

partial

Simple, complex

Tegretol tab 200, CR100, CR400 Syrup100

<1 y 100- 200 1-5 y 200-400

5-10 y 400-600 10-15y 600- 1000 على مرتين

: التهاب الأعصاب

Gaptin 100, 300, 400 cap كبسولة مرة واحدة يومياً

: التبول الليلي

Uripan (tab, syrup) 9LE قرص أو ملعقة عند النوم

Minirin (nasal spray) 103 LE بخة عند النوم مع رفع الرأس

Tofranil (10, 25 tab) 2LE 1-2 قرص قبل النوم

: المهدئة

Buspar 10, 15 (tab) 11 LE 5 مجم (½ قرص) 3 مرات يومياً 3 مرات يومياً

Neuril 2, 5, 10 (tab, amp) 2LE قرص 3 مرات يومياً

Generalized

Grand mal, absence, tonic clonic, myoclonic

Depakine 200 tab **depakine chrono** once daily

15 – 30 mg /kg/day

Anti fungal

Systemic:

Fungican (1cap) 10LE كبسولة مرة واحدة لفطريات المهبل

Arozole 100 (14 cap) 56 LE *Vulvovaginitis* 200 mg /2 daily/ 7 days

P. versicolor 200 mg / 1daily /7days

Dermato 200mg/ 1daily / 7days

Kizole (10 tab) 18 LE قرص مرة واحدة أثناء الأكل لمدة أسبوع على الأقل

Griseovin (susp) ملعقة صغيرة 3 مرات يومياً

Topical:

Closol (spray) 6.5 LE *candida* مرتين يومياً

Trosyd (cream, solution for hairy areas) 8LE *tinea*

Fungiban (lamisil) (gel) مرتين يومياً

Daktarin (cream) 6LE

روشتة التينيا:

Griseovin ملعقة 3 مرات يومياً

Nizoral (curazole H) shampoo وضع علي الشعر 10 دقائق

Lamisil (cream) 15 LE

Vaginal:

Gynetrotyd (vaginal tab, cream) مرة واحدة يومياً لمدة 3 أيام ويكرر أن لم يتحسن 3 أيام أخرى

Amrizole N (vaginal supp) *candida* لبوسة مرة واحدة لمدة أسبوعين

Canesten (vag. Tab 100, 500) قرصين في المهبل مرة واحدة لمدة 3 أيام

Betadine (vaginal douch)

Premarin (cream) (لتقليل أعراض سن اليأس estrogen) مرة واحدة لمدة 24 يوم كل شهر

Instead of premarin we can use cidolut nor and can be used to delay menses 1 tab 3 times daily 5 days before

Topical corticosteroid: eczema +itching

Cream → Once daily

Oint → Twice daily

Betnovate (cream, oint) 5LE (high potency)

Betaderm (cream, oint) 2.5LE (intermediate potency)

Locasalen (ointment) 4LE, **diprosalic** (cream 4 LE, lotion 9LE) (CST + Salicylate)

لعلاج الصدفية والأكزيما المستعصية ليس بها كورتيزونات:

When CST is CI as infants, children, pregnancy, DM in long term therapy

Bioclear (lotion, gel) 4 LE مرتين يومياً

Elidel 120LE مرتين يومياً

When infection is superadded:

Quadriderm (cream) 4.5LE مرتين يومياً

bed sores, skin ulcer:

Rofa gel 27LE

Bacterial vaginal infection

Bidalkin powder

كيس على لتر ماء بارد مرتين يومياً

Betadine supp 1x1x7

Amrizole 500 tab

قرص 3 مرات بعد الأكل

Ibidroxil cap 1/2/7

Vaginal fungal infection:

Flucoral 150 mg كبسولة اسبوعياً لمدة اسبوعين

Betadine vaginal douch كيس على لتر ماء مرتين

Gynotrosyd vaginal supp 3 مرات يومياً

إلتهاب الحفاض:

Baby quard cream مرتين أو عند تغيير الحفاض

Kenacomb cream 2-1 مرة يومياً

Warts , corns :

Collomack paint 6.5 £E مرتين يوميا

Wound healing :

Mebo (cream) 16 £E

Iruxol (oint) 20 £E 1 X 1 X 8 W

تشققات الجلد :

Hipanten (cream) 6 £E 1X2

Panthenol (cream)

Purelan (cream) تشققات الحلمة

الحروق :

Betadine (solution , oint) 2 £E ليس في الحمل

Dermazine (cream) 3 £E

Fucidine (cream , oint) topical antibiotic 1 x 2-3

Sofratull gauz

Topical antiviral :

Novirus (cream) كل أربع ساعات

Mouth wash :

Betadine MW 3مرات لمدة 3 دقائق

Oracin

Tantum verde

أقراص إستحلاب :

Stripsore 24 loz 10 £E

Tantum verde P 20 £oz 3 £E

Candy 22 loz 15 £E

ZoraC 3 £E

NB: Cream is used for face and wet skin but ointment is used for dry skin

Oral antifungal: Betadine MW 3min/3times +

Daktarin (Oral gel) 18 £E

Miconaz (oral gel) 5 £E 1/2 children / 1/4 Infant 4 مرات يوميا

Fungistatin (oral susp) 4 £E

Nystatin (oral drops) 4 £E 4مرات يوميا أطول فترة ممكنة

Oral ulcers :

Salivex - L (Paint) 5 £E

Mundisal (gel) 6 £E

ألم الأسنان :

Dentocalm (oint) 1.5 £E

Gonorrhea:

Cefobid vial حقنة واحدة عضل ولا تكرر

Rimactane 300 cap كبسولة كل 8 ساعات لمدة 3 أيام

Urisept قرص 3 مرات بعد الأكل

رائحة الفم الكريهة:

Betadine MW

Vibramycin cap 1/1/10 after food by 1 h

Amrizole 250 tab 3مرات بعد الأكل

Intertrigo :

Calamine lotion 3مرات يومياً

+ Betnovate (Quadriderm)

Local analgesis :

Voltarin (gel) 5 £E 1x3

Ketolgin (gel) 3£E 1x3

Felden (gel) 6.5£E CI in pregnancy , lactation

Radian massage cream

Rubralgin (cream) 2£E

: طبيعى للإحتقان

Robb (oint) 3£E

Sunscreen :

Luna 7 lotion 34£E

منع مص الأظافر

No Habit (lotion) 10£E

: الكدمات

Hemoclar (oint) 5.5£E 3X1

Reparil - n (gel) 9£E

Acne : Sacnel (soap) ± oral antibiotic +
يمسح الوجه 5 دقائق ثم يغسل بالماء

Inflammatory :

Acne benz 13.5£E يخلط كمية من الأنثوبنتين ثم يدهن مرتين صباحاً ومساءً بعد غسيل الوجه بالماء الدافئ

Non inflammatory :

Acne - free 0.25,0.5,0.1 cream 5£E CI IN pregnancy (teratogenic) يوضع مساءً ويغسل صباحاً

: تفتيح لون البشرة

Olay

Fair & lovely

Scar:

Contractubex (gel) 18£E 3مرات يومياً لو hard يظل طوال الليل

قشر الشعر

1-Curazole H (shampoo) 12£E مرتين اسبوعياً ويترك 5 دقائق

2-Rootage (cream) يوم بعد يوم

مغذى للشعر

Pantene (shampoo)

سقوط الشعر

Hair stabil (shampoo) 10£E يوم بعد يوم

Tonoscalpine (lotion) 9£E يوم بعد يوم علي شعر مبلل

For Hair & Nail (Cap) 9£E كبسولة مرتين يومياً لمدة ثلاث شهور

Scabies :

Eurax (cream, lotion) 6LE مرة واحدة لمدة 3 أيام

Sulphur (soap) يوضع على الجسم ويغسل بليفة خشنة ويتم للبيت كله

القمل

Licid

Eurax

P.resea

Rosagel (gel) مرتين يومياً

للإحتقان

Afrin (drops, spray, ped drops) 3LE 1x2

Otrivin (drops, spray, ped drops) 5LE 1x2

New born : lyse (otrivin baby saline) (drops) 2LE 1x3

Snoring :

Snore no more (nasal spray) 45LE 2بخة قبل النوم

حساسية الأنف

Nasotal (drops, spray) 6LE 1X3

Eye & ear

Antibiotic :

Terramycin (eye oint) 2LE قبل النوم

Tobralex (oint, drops) 5LE كل 6 ساعات

Ocuflox (drops) 4.5LE 4مرات يومياً لأقل من 10 أيام

Ciprocin (drops, oint) 4مرات يومياً

5LE corneal ulcer نقطتين كل ربع ساعة أول يوم ثم كل ساعة ثانياً يوم ثم كل 4 ساعات ثالث يوم &

3 نقط كل أربع ساعات otitis externa

polyspectran drops 6.5LE 1 /4-6h

Trachoma :

Isoptocetamide (drops) 5LE كل ساعتين **chronic** كل 4 ساعات **acute**

Decongestant :

Visine (drops) 5LE 3مرات

Prisoline (naphazolin + chlopheneramine) (drops) 3LE 3 مرات للحساسية والإحمرار

Lubricants :

Liquifilm tears (drops) 2LE

Glaucoma :

Timolol 0.25, 0.5 مرة واحدة

Cosopt 74 LE 1X2

Sinusitis:

Diprofos amp حقنة عضل مرة واحدة ولا تكرر

Ciprofar 500 قرص كل 12 ساعة

Clarinate tab قرص كل 12 ساعة **chronic**

Nasotal spray كل 12 ساعة **chronic**

Flixonase spray كل 12 ساعة **chronic**

Cataflam 50 قرص كل 12 ساعة

Acute Allergic rhinitis:

Clarinate tab قرص كل 12 ساعة

Nasotal spray كل 12 ساعة

± antibiotic ± afrin

مخدر لعمليات العين مثل الرايش

Benox (drops) 4LE

Allergy :

Opticure (drops) 3 مرات

Antibiotic for ear only :

Cidocetin (chloramphenicol) (ear drops) 1 x 3 x 7

Ear Wax & pain :

Ear Cure (drops) 2 x 3

+ Ear wax (drops) 2 x 3 x 3

التهاب الأذن الوسطى والخارجية :

Polyspectran drops 1-2 نقطة 3 مرات

Ear cure drops 1-2 نقطة 3 مرات يومياً

Bactiolor 500 cap/ 8h/10days

or Curisafe 500 cap كبسولة كل 12 ساعة

Cataflam 50 cap مرتين يومياً

allergex for itching وفي الأذن الخارجية نضيف

First aid in burn :

1st, 2nd degree:

**Betadine + dermazine +sofratull
(gauze)+ibidroxil+iruxol+avil**

3rd degree:

1 – cannula and Ringer

2 – avil amp + epidron + tetanus(do allergy)

3 – analgesia (nalufin)

4 – eye drops (terramycin)

تم بحمد الله وفضله

تم الرفع بواسطه

موقع هدف واحد

www.1aim.net